


Logopeda radzi

OBSERWUJ NIEPOKOJĄCE SYMPTOMY
I REAGUJ W PORĘ!




Przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych

W tym przypadku warto sprawdzić stan migdałków podniebiennych oraz migdała gardłowego tzw. trzeciego migdała. W przypadku przerostu warto dodatkowo wykonać badanie słuchu.




Problemy ze słuchem

Dziecko, które ma problemy ze słuchem (np. w wyniku przerostu migdałów) może nieprawidłowo odbierać dźwięki z otoczenia, co skutkować może powstaniem wad wymowy. .



Oddychanie ustami

Niesie za sobą wiele przykrych konsekwencji min. wady wymowy, wady zgryzu, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowe połykanie, gotyckie podniebienie, osłabienie mięśnia okrężnego warg, gapciowaty wyraz twarzy, przerost migdałów



Język spoczywający na dnie jamy ustnej

Nieprawidłowa pozycja spoczynkowa jest bardzo częstą przyczyną seplenienia międzyczębowego. Język ułożony na dnie jamy ustnej wpływa nieprawidłowo na rozwój szczęki oraz żuchwy.



Niepokojące reakcje i zachowania dziecka

Ssanie kciuka, pieluszki, języka. Zastanianie uszu w reakcji na dźwięki z otoczenia, wygórowany odruch wymiotny, schematyczne działanie, myślenie stereotypowe, brak kontaktu wzrokowego, wrażliwość na bodźce, trudności ze skupieniem uwagi.